

## Ärztliche Information

# Substanzen mit Wirkung auf die Thrombozytenfunktion (Auswahl)

### Relevante, orale Thrombozytenfunktionshemmer

- Acetylsalicylsäure (ASS) - Zeit bis zur Erholung der Thrombozytenfunktion nach Absetzen: 5-7 Tage
- Clopidogrel - Zeit bis zur Erholung der Thrombozytenfunktion nach Absetzen: 7 Tage
- Prasugrel - Zeit bis zur Erholung der Thrombozytenfunktion nach Absetzen: 7-10 Tage
- Ticagrelor - Zeit bis zur Erholung der Thrombozytenfunktion nach Absetzen 3-5 Tage

### Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)

- Diclofenac, Ibuprofen, Indometacin, Naproxen, Piroxicam

### Beta-Laktam-Antibiotika

- Penicilline wie Ampicillin, Carbenicillin, Mezlozillin, Penicillin, Piperacillin, Isocillin  
Cephalosporin wie Cephalotin, Cefamandol, Cefotaxim, Latamoxef, Moxalactam
- Antimykotika wie Miconazol, Fluconazol
- Nitrofurantoin

### Medikamente mit Erhöhung von cAMP oder cGMP

- Prostaglandin E1
- Phosphodiesterasehemmer: Dipyridamol, Sildenafil, Koffein, Theophyllin, Aminophyllin

### Herz-Kreislauf Medikamente


- **Nitrate:** Nitroprussid, Nitroglycerin, Isosorbiddinitrat
- **Beta-Blocker:** Propranolol, Nebivolol, Pindolol, Metoprolol, Atenolol
- **Kalziumantagonisten:** Verapamil, Nifedipin, Diltiazem, Felodipin, Nocardipin
- **ACE-Hemmer:** Captopril, Enalapril, Lisinopril, Ramipril
- **Angiotensin-Rezeptorblocker:** Valsartan, Losartan, Olmesartan
- **Antiarrhythmika:** Chinidin

### Statine

- Atorvastatin, Cerivastatin, Fluvastatin, Lovastatin, Pitavastatin, Pravastatin, Rosuvastatin, Simvastatin

### Antiepileptika, Medikamente gegen neuropathische Schmerzen

- Gabapentin, Valproat, Pregabalin



## Antikoagulantien, Fibrinolytika, Antifibrinolytika

- **Heparine:** Unfraktioniertes Heparin, niedermolekulares Heparin
- **Thrombolytika:** Streptokinase, Urokinase, gewebespezifischer Plasminogenaktivator (t-PA)
- **Antifibrinolytika:** Aminocapronsäure, Tranexamsäure

## Plasmaexpander

- Dextrane, Hydroxyethylstärke

## Antihistaminika

- Chlorpheniramin, Diphenhydramin, Antazolin

## Röntgenkontrastmittel

## Psychopharmaka

- **Trizyklische Antidepressiva:** Imipramin, Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin, Doxepin, Mianserin
- **Phenothiazine:** Chlorpromazin, Promethazin und andere
- **Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI):** Fluoxetin, Paroxetin, Sertralin, Escitalopram, Citalopram, Venlafaxin

## Chemotherapeutika

- Mithramycin, Daunorubicin, Melphalan, Carmustin, Cyclophosphamid, Cisplatin, zahlreiche Inhibitoren der Bruton Tyrosinkinase

## Anästhetika, Narkotika

- Benoxinat, Morphin, Benzocain, Kokain, Heroin, Lidocain, Hydroxychloroquin

## Andere Wirkstoffe

- Clofibrat, Etofibrat
- Tamoxifen (Östrogenrezeptor-Modulatoren)

## Phytopharma

- Ginseng, Gingko biloba, Resveratrol

## Nahrungsergänzungsmittel, Gewürze und Vitamine

- Ingwer, Zwiebel, Vitamin E, Kreuzkümmel, Kurkuma, Nelkenöl, Alkohol, Omega 3 Fettsäuren, chinesischer schwarzer Baumpilz, Knoblauch, Luteolin, Rutin (Isoquercetin)

